


Qui suis-je et comment me choisir ?



Sécurité garantie !

Je suis un dispositif médical

Marquage CE et conformité avec le règlement européen 2017/745 (Dispositifs Médicaux de classe I)

- Norme NF EN 455-1 à -4

Je suis un Equipement de Protection Individuelle

Conformité avec le règlement européen 2016/425 relatif aux EPI (ou PPE en anglais) de catégorie 3

- EN ISO 21420 : Innocuité, confort et efficacité, marquage
- EN ISO 374-5 : Risques liés aux micro-organismes

Toutes les informations utiles figurent sur la boîte

LATEX matériau

2 usage unique

M taille

Biohazard Protection contre le risque microbologique

Fork and Glass contact direct avec les aliments possible

Sha et moi, unis pour le meilleur !

Une friction hydro-alcoolique
AVANT de me prendre dans la boîte ...
et hop !
j'évite de CONTAMINER les autres
gants avant qu'ils ne soient prélevés
par la personne suivante !

Retrouvez-nous en animation !




Comment déterminer votre taille de gant ?

1. Positionnez votre main majeure (la droite) sur le gabarit, doigts serrés et pouce écarté
2. Veillez à respecter la position du creux du pouce
3. Déterminez votre taille à l'aide des repères à droite



A imprimer en
taille réelle
GABARIT DROITIERS



LARGE

MEDIUM

SMALL

S

M

L

Guide des tailles

6-7

7-8

8-9

81-87

91-97

102-108

mm

mm

mm

Indications :

- Lors de contact ou risque de contact avec du sang ou tout autre liquide biologique d'origine humaine.
- Lors de contact avec les muqueuses et la peau lésée du patient.
- Lorsque les mains du soignant comportent des lésions.
- Lors de contact avec des produits chimiques (entretien des locaux et des dispositifs médicaux).



Points de vigilance :

- Privilégier les gants UU sans latex pour maîtriser le risque allergique.
- Privilégier les gants non poudrés pour réaliser une hygiène des mains par friction avec un produit hydroalcoolique (PHA).

Règles de bonnes pratiques : un soin = une paire de gants

1. Pratiquer une hygiène des mains avant de prendre les gants dans la boîte.
2. Mettre les gants juste avant le geste, les retirer et les jeter immédiatement après la fin du geste.
3. Ne pas réutiliser de gants et changer les gants systématiquement :
 - Entre deux patients.
 - Pour un même patient, entre deux activités de niveaux d'asepsie différents.
4. Pratiquer une hygiène des mains après le retrait des gants.

Remarques :

- Ne pas porter de gants lors des contacts avec la peau saine.
- Ne pas laver les gants.
- Ne pas désinfecter les gants.

Exemples de gestes requérant le port de gants :

- Prélèvements sanguins.
- Pose de cathéter veineux.
- Élimination des urines.
- Lors de la toilette : contact avec les muqueuses (bouche, toilette intime...).

Passer les gants



1. FHA avant.



2. Choisir une taille de gants adaptée à l'utilisateur.



3. Enfiler les gants en les tenant par leur bord supérieur.

Retirer les gants



1. Positionner ses mains vers le bas.
2. Pincer le 1er gant au niveau du poignet et le retirer en le retournant sur la main. Réaliser les gestes en douceur.



3. Tenir le 1er gant retiré dans la main gantée.



4. Glisser les doigts de la main dégantée entre le gant et le poignet de l'autre main.
5. Éliminer les gants.



6. FHA après.

Port de gants stériles pour la protection des patients : garantir l'asepsie du geste.
Ex. : pose de sonde urinaire, intervention sur voie centrale, picc line...

