



LA TROUSSE D'URGENCE AU CABINET DENTAIRE

Elle doit être signalée par un panneau, conservée dans un endroit rapidement accessible et vérifié régulièrement (programmer un rappel dans le planning par exemple).

Date de révision prévue :

Matériel	Péremption Changement de la batterie
Masque à haute concentration à oxygène (usage unique, plusieurs tailles)	
BAVU (ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle)	
Tensiomètre automatisé	
Défibrillateur externe	
Oxymètre de pouls	
Bandelette réactive de glycémie	
Lecteur de glycémie	
Compressees stériles	
Aiguilles sous-cutanées	
Kit gestion des hémorragies	Gants non stériles, ciseaux de sécurité, compressees, pansements simples, pansement compressif, garrot tourniquet

MÉDICAMENTS	INDICATIONS	CONTRE-INDICATIONS	UTILISATION	PÉREMPTION
AERIUS 5 mg CP	Allergies	Grossesse & allaitement	<u>1 cp</u> si manifestations allergiques	
ALPRAZOLAM 0,25 mg (benzodiazépine)	Crise d'angoisse Convulsions	Insuffisance hépatique grave, insuffisance respiratoire grave	<u>1 cp</u> à faire fondre sous la langue	
ANAPEN 0,30 mg Solution Injectable (Adrénaline) ADULTE	Choc anaphylactique (patient >30kg) Œdème de Quincke avec signes respiratoires	Utilisation si extrême nécessité chez patient cardiaque	<u>Injection IM</u> dans face antéro-latérale cuisse (1 fois) <u>Effets secondaires :</u> sueurs, palpitations, tachycardie, tremblements, nausées	
ANAPEN 0,15 mg solution injectable (Adrénaline) ENFANT	Choc anaphylactique (enfant <30kg) Œdème de Quincke avec signes respiratoires		<u>Injection IM</u> dans face antéro-latérale cuisse (1 fois) <u>Effets secondaires :</u> sueurs, palpitations, tachycardie, tremblements, nausées	

MÉDICAMENTS	INDICATIONS	CONTRE-INDICATIONS	UTILISATION	PÉREMPTION
ASPIRINE 160 mg	Après avis du SAMU pour syndrome coronarien aigu	Seule contre-indications en urgence : allergie	A <u>diluer</u> dans un fond d'eau à avaler	
BISEPTINE	Désinfection cutanée avant injection		Application avec compresse	
GLUCAGEN KIT 1mg (seringue pré dosée de 1ml)	Patient diabétique présentant une hypoglycémie avec troubles de conscience	Phéochromocytome, hyperglycémie	Vider la seringue préremplie dans le flacon de poudre, agiter doucement et aspirer dans la seringue. Injection après <u>purge en sous cutanée ou en intramusculaire</u>	
GLUCOSE 30%	Hypoglycémie sans troubles de la conscience (patient diabétique)	Hyperglycémie	Faire boire au patient, renouveler si besoin	
Oxygène médical	Insuffisance respiratoire, dyspnée avec désaturation, patient inconscient	Graisse (sur main ou visage risque d'inflammation) Flamme ou corps incandescent à proximité	Patient conscient : <u>9 l/min</u> Insufflation par ballon (patient inconscient) <u>15 l/min</u>	

MÉDICAMENTS	INDICATIONS	CONTRE-INDICATIONS	UTILISATION	PÉREMPTION
PARACETAMOL CODEINE (500/30) Cp effervescents	Traitement préventif ou curatif des douleurs d'intensité modérée à intense chez l'adulte (La dose doit être adaptée pour l'enfant)	Pathologie hépatique Allergie Asthme ou insuffisance respiratoire	1 à 2 comprimés à dissoudre dans un fond d'eau. Délai d'action <u>30 min</u>	
PARACETAMOL 500 mg Cp effervescents	Traitement préventif ou curatif des douleurs d'intensité faible à modérée chez l'adulte. (La dose doit être adaptée pour l'enfant)	Pathologie hépatique Allergie	1 à 2 comprimés à dissoudre dans un fond d'eau. Délai d'action <u>30 min</u>	
PRENIDSOLONE 20 mg Cp orodispersible	Œdème de Quincke sans signes respiratoires		<u>1 mg/kg</u> soit 4 comprimés pour un patient de 80 kg à mettre dans la bouche pour délitement dans la salive, sinon le déliter au préalable dans l'eau	

MÉDICAMENTS	INDICATIONS	CONTRE-INDICATIONS	UTILISATION	PÉREMPTION
SALBUTAMOL Aérosol	Crise d'asthme		<u>2 bouffées en inhalation</u> , à renouveler quelques minutes plus tard si la gêne persiste.	